

Strategie di contenimento degli errori terapeutici: nuova lista farmaci LASA Ospedale specifica

Autori

X. Taci (1), S. Faoro (2), C. Battistutta (2), C. Giroto (3), A. Udilano (3), N. Realdon (1), F. Venturini (2)

Affiliazione



1. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Padova
2. UOC Farmacia Ospedaliera, Azienda Ospedale - Università Padova
3. UOS Rischio Clinico, Azienda Ospedale - Università Padova




Introduzione

Dal 6 al 15% degli errori terapeutici sono riconducibili a farmaci LASA. Nel 2010 il Ministero della Salute (MSAL) pubblica la Raccomandazione n.12 con lo scopo di ridurre gli errori terapeutici determinati da farmaci facilmente confondibili per somiglianza grafica della confezione e/o fonetica del nome, fornendo inoltre una lista di medicinali LASA (aggiornata al 31/12/2015) da attenzionare.

Materiali e Metodi



Risultati



UU.OO. che hanno segnalato almeno una coppia LASA: **49%**

Percentuale di coppie segnalate fonti di effettivo errore terapeutico: **8%**

Alcune delle coppie segnalate dalle UU.OO. attraverso la survey e valutate come potenziali farmaci LASA dalla UOC Farmacia e UOS Rischio Clinico.



Conclusioni

Fornire una lista contenente solo i medicinali in PTO e aggiornarla con l'introduzione di nuove coppie LASA, segnalate dalle UU.OO. e valutate multidisciplinariamente dalle UOC Farmacia e UOS Rischio Clinico rende l'individuazione più efficace e immediata. La lista verrà periodicamente inviata alla CTA aziendale per eventuali adeguamenti del PTO, i quali notificati alla stazione appaltante regionale potrebbero consentire l'inserimento di nuovi criteri nelle procedure di gara per la prevenzione degli errori terapeutici.